

## Uitgebreide toelichting van het meetinstrument

### Vragenlijst voor de palliatieve zorg

### Palliative care Outcome Scale (POS)

Maart 2016

Review: Sandra Joeris  
Eveline van Engelen

Invoer: Marsha Bokhorst

#### 1 *Algemene gegevens*

	Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
<b>Lichaamsregio</b>	Overige, ongespecificeerd
<b>Aandoening (ICD)</b>	Overige, ongespecificeerd
<b>Domein 'Menselijk functioneren' (ICF)</b>	Persoonlijke factoren

- *Korte beschrijving* → De vragenlijst voor de palliatieve zorg is een meetinstrument dat de toestand van de patiënt in de palliatieve zorg inventariseert zodat hulpverleners beter kunnen voldoen aan de behoeften van de palliatieve patiënt. Er zijn twee verschillende versies, voor patiënten en voor de staf. Bij beide versie wordt ingegaan op de afgelopen 3 dagen.
- *Doelgroep* → patiënten in de palliatieve fase en patiënten met kanker<sup>1</sup>
- *Auteur:*
  - ✓ *Oorspronkelijke versie* → Hearn J, Higginson IJ (1999)<sup>1</sup>
  - ✓ *Nederlandse versie* → beschikbare versie afkomstig van <http://pos-pal.org/><sup>2</sup>

#### 2 *Doel van het meetinstrument*

- Inventariserend / evaluatief

### 3 *Soort / vorm van het meetinstrument*

- Vragenlijst
- *Opbouw* → patiëntenversie: 12 items, stafversie: 11 items
- *Invulinstructie* → een korte invulinstructie staat bovenaan de vragenlijst
- *Meetniveau* → per item: meetniveau nominaal (behalve item 11); wijze score:
  - Patiëntenversie:
    - item 1- 8: (0,1,2,3,4)
    - item 9 en 12: (0,1,2)
    - item 10: (0, 2,4, 0)
    - item 11: de patiënt beschrijft wat zijn voornaamste problemen de afgelopen 3 dagen waren
  - Stafversie:
    - items 1-11: zoals bij patiëntenversie
- *Meetniveau* → totaalscore: wijze score:
  - patiëntenversie: (0-40); meetniveau nominaal (behalve item 11)
  - stafversie: (0-36): meetniveau nominaal (behalve item 11)

### 4 *Verkrijgbaarheid*

- *Opvraagbaar bij* → [www.meetinstrumentenzorg.nl](http://www.meetinstrumentenzorg.nl)
- *Geschatte kosten* → gratis te downloaden
- *Copyright* → ja, 1999, The BMJ Publishing Group Ltd.<sup>1</sup>

### 5 *Methodologische kwaliteit*

Gegevens over de methodologische kwaliteit zijn te vinden in de volgende reviews:

- Jordhoy MS, Inger Ringdal G, Helbostad JL, Oldervoll L, Loge JH, Kaasa S. Assessing physical functioning: a systematic review of quality of life measures developed for use in palliative care. 2007<sup>3</sup>
- Pearson EJ, Todd JG, Fitcher JM. How can occupational therapists measure outcomes in palliative care? 2007<sup>4</sup>
- Selman L, Siegert R, Harding R, Gysels M, Speck P, Higginson IJ. A psychometric evaluation of measures of spirituality validated in culturally diverse palliative care populations. 2011<sup>5</sup>
- Parker D, Hodgkinson B. A comparison of palliative care outcome measures used to assess the quality of palliative care provided in long-term care facilities: a systematic review. 2011<sup>6</sup>

### 6 *Hanteerbaarheid / feasibility*

- *Taal* → origineel Engels, vertaald in Nederlands
- *Benodigheden* → invulformulier
- *Randvoorwaarden* → geen
- *Benodigde tijd* → patiëntenversie: 7 minuten; stafversie: 6 minuten<sup>7</sup>
- *Gebruikshandleiding* → nee

## 7 *Normgegevens*

- *Uitkomstklassen en normgegevens* →  
Interpretatie: hoe hoger de uitkomsten voor ieder lijst, des te slechter is de toestand van de patiënt of de omstandigheden van de staf.

## 8 *Overige gegevens*

- Er is een aanvullende module ontwikkeld om symptomen in kaart te brengen, de POS-S. Deze is beschikbaar voor aandoeningen als multiple sclerose, Parkinson en nierziektes in de eindstadia.<sup>2</sup>

## 9 *Literatuurlijst*

1. Hearn J, Higginson IJ. Development and validation of a core outcome measure for palliative care: the palliative care outcome scale. Palliative Care Core Audit Project Advisory Group. Quality in health care. 1999 Dec;8(4):219-227.
2. POS: Palliative care Outcome Scale: a resource for palliative care. London: Cicely Saunders Institute. Available from: <http://pos-pal.org/> [Geraadpleegd op: 2016 Mar 2]
3. Jordhoy MS, Inger Ringdal G, Helbostad JL, Oldervoll L, Loge JH, Kaasa S. Assessing physical functioning: a systematic review of quality of life measures developed for use in palliative care. Palliative medicine. 2007 Dec;21(8):673-682.
4. Pearson EJ, Todd JG, Futcher JM. How can occupational therapists measure outcomes in palliative care? Palliative medicine. 2007 Sep;21(6):477-485.
5. Selman L, Siegert R, Harding R, Gysels M, Speck P, Higginson IJ. A psychometric evaluation of measures of spirituality validated in culturally diverse palliative care populations. Journal of pain and symptom management. 2011 Oct;42(4):604-622.
6. Parker D, Hodgkinson B. A comparison of palliative care outcome measures used to assess the quality of palliative care provided in long-term care facilities: a systematic review. Palliative medicine. 2011 Jan;25(1):5-20.
7. Meetinstrumenten palliatieve zorg: Palliative care Outcome Scale (POS). Amsterdam: VUmc. Beschikbaar via: <https://www.vumc.nl/afdeling/meetinstr-palliatieve-zorg/instrumenten/pos/> [Geraadpleegd op: 2016 Mar 2].