

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument

Modified Somatic Perception Questionnaire (MSPQ)

December 2021

Review: D Ummels
Invoer: ML Bokhorst

1 *Algemene gegevens*

	Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio	Overige
Aandoening (ICD)	Bewegingsapparaat
Domein 'Menselijk functioneren' (ICF)	Sensorische functies en pijn

- *Korte beschrijving* → De MSPQ heeft 13 vragen voor het identificeren van somatische klachten die geassocieerd kunnen worden met psychologische reacties zoals angst of depressie. De vragenlijst wordt vooral gebruikt bij mensen met chronische pijn.
- *Doelgroep* → mensen met chronische pijn
- *Auteur:*
✓ *Oorspronkelijke versie* → Main CJ (1983)¹

2 *Doel van het meetinstrument*

- Diagnostisch
- Evaluatief

3	<i>Soort / vorm van het meetinstrument</i> <ul style="list-style-type: none">• Vragenlijst• <i>Opbouw</i> → totaal 13 items• <i>Instructie</i> → patiënt vult de vragenlijst zelfstandig in• <i>Meetniveau</i> → per item: wijze van score (0-3); meetniveau ordinaal variërend van 0=helemaal niet tot 3=extreem, kon niet slechter• <i>Meetniveau</i> → totaalscore: wijze van score (0-39); meetniveau ordinaal De totaalscore wordt verkregen door de scores per item bij elkaar op te tellen.
4	<i>Verkrijgbaarheid</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Opvraagbaar bij</i> → www.meetinstrumentenzorg.nl (Engelstalige versie)• <i>Geschatte kosten</i> → gratis te downloaden• <i>Copyright</i> → onbekend, zie ook bij FAQ op meetinstrumentenzorg.nl
5	<i>Methodologische kwaliteit</i> <p>Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende reviews:</p> <ul style="list-style-type: none">- Haywood KL, Staniszewska S, Chapman S. Quality and acceptability of patient-reported outcome measures used in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review. 2012²- Zijlema WL, Stolk RP, Lowe B, Rief W, White PD, Rosmalen JGM. How to assess common somatic symptoms in large-scale studies: a systematic review of questionnaires. 2013³
6	<i>Hanteerbaarheid / feasibility</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Taal</i> → originele versie Engels¹• <i>Benodigdheden</i> → pen en papier• <i>Benodigde tijd</i> → ongeveer 10 minuten• <i>Gebruikershandleiding</i> →
7	<i>Normgegevens</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Interpretatie</i> →<ul style="list-style-type: none">- Een cut-off waarde van 18 lijkt geschikt om somatisatie te diagnosticeren.⁴- Iemand met aanzienlijke somatische klachten zou in aanmerking komen voor psychologische interventies om te helpen ermee om te gaan.

8 *Overige gegevens*

- Zorgprofessionals kunnen de MSPQ gebruiken bij patiënten met systeem- of neurologische aandoeningen, misbruik van verboden middelen en etnische minderheden maar moeten hierbij rekening houden met verminderde validiteit.⁴

9 *Literatuurlijst*

1. Main CJ. The Modified Somatic Perception Questionnaire (MSPQ). *J Psychosom Res.* 1983;27(6):503-514.
2. Haywood KL, Staniszewska S, Chapman S. Quality and acceptability of patient-reported outcome measures used in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review. *Qual Life Res.* 2012;21(1):35-52.
3. Zijlema WL, Stolk RP, Lowe B, Rief W, White PD, Rosmalen JGM. How to assess common somatic symptoms in large-scale studies: a systematic review of questionnaires. *J Psychosom Res.* 2013;74(6):459-468.
4. Balasanyan M. Examination of the Modified Somatic Perception Questionnaire (MSPQ) in a large sample of credible and noncredible patients referred for neuropsychological testing. *Clin Neuropsychol.* 2018;32(1):165-182.